

# קורס בפיזיקה לכיתה יב

## פרק 2

### הכוח החשמלי - חוק קולון

1..... הכוח החשמלי - חוק קולון

## הכוח החשמלי - חוק קולון:

שאלות:

חוק קולון:

### 1) אלקטרון ופרוטון

אלקטרון ופרוטון נמצאים במרחק של 3A אחד מהשני. מהו הכוח הפועל על כל אחד מהם? (גודל וכיוון).

### 2) שני מטענים על ציר ה-X

שני גופים טעונים במטענים:  $q_1 = 0.2mc$ ,  $q_2 = 0.3mc$ .

מיקום הגוף הראשון הוא:  $\vec{r}_1(3m, 0)$  ומיקום הגוף השני הוא:  $\vec{r}_2(8m, 0)$ .

א. חשב את הכוח החשמלי הפועל על כל גוף גודל וכיוון.

ב. מהי תאוצת כל גוף באותו הרגע אם מסותיהן הן:  $m_1 = 3kg$ ,  $m_2 = 8kg$ .

### 3) שני מטענים במישור

שני גופים טעונים במטענים:  $q_1 = 15\mu c$ ,  $q_2 = -20\mu c$ .

מיקום הגוף הראשון הוא:  $\vec{r}_1(0, 0)$  ומיקום הגוף השני הוא:  $\vec{r}_2(5m, 3m)$ .

א. חשב את הכוח החשמלי הפועל על כל גוף גודל וכיוון.


ב. מהי תאוצת כל גוף באותו הרגע אם מסותיהן הן:  $m_1 = 3kg$ ,  $m_2 = 8kg$ .

### 4) 3 מטענים על ציר ה-X

שלושה מטענים מונחים על ציר ה-X במרווחים של  $d = 10cm$  אחד מהשני.

גודל המטענים הוא:  $q_1 = 2\mu c$ ,  $q_2 = -10\mu c$ ,  $q_3 = 5\mu c$ .


מצא את הכוח הפועל על כל מטען גודל וכיוון.




תרגילים:

### 5) מטען בפינת ריבוע

חשב את הכוח הפועל על המטען בפינה הימנית התחתונה של הריבוע. q ו-a נתונים.






**(6) שני כדורים תלויים**

שני כדורים בעלי מסה  $m$  ומטען זהה תלויים מהתקרה ע"י חוטים בעלי אורך  $L$ , הזווית בין החוטים היא  $30^\circ$  מעלות. מצא את מטען הכדורים.


**(7) מהירות זוויתית באטום המימן**

אטום המימן מורכב מפרוטון בגרעין ואלקטרון הסובב סביב הגרעין בתנועה מעגלית ברדיוס של  $0.53$  אנגסטרומ. מצא את המהירות הזוויתית של האלקטרון, אם ידוע כי מסת האלקטרון היא:  $m_e = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$  ומטען האלקטרון והפרוטון הוא:  $q_e = -1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} = -q_p$ .




**(8) מטענים בקודקודי משולש**

שלושה מטענים זהים נמצאים על קודקודיו של משולש שווה צלעות. גודל כל מטען הוא  $q = 2 \mu\text{C}$  ואורך צלע המשולש היא  $4 \text{ m}$ . מצא את הכוח שמרגיש כל מטען כתוצאה מהמטענים האחרים.



**(9) נחש את סימן המטענים**

שני מטענים נקודתיים ממוקמים בקודקודי משולש ישר זווית, בקצוות המיתר  $AB$ . נתון כי:  $Q_3 = 3 \mu\text{C}$ ,  $|q_1| = 3 \mu\text{C}$  והכוח השקול  $F$  הפועל על  $Q_3$  פועל בכיוון אופקי שמאלה במקביל לצלע  $AB$ . בהזנחת כוח הכובד:  
א. מהם סימני המטענים  $q_1$  ו- $q_2$ ? נמק.  
ב. חשב את מטען  $q_2$  אם הזווית  $\angle ACB$  היא זווית ישרה.  
ג. מהו גודלו של הכוח השקול  $F$ ?



**(10) שני מטענים תלויים**

שני כדורים שמסתם זהה  $m = 8 \text{ gr}$  ומטען זהה  $q$ , תלויים באמצעות חוטים משתי נקודות שהמרחק ביניהם הוא  $d = 2 \text{ cm}$ . נתון:  $\alpha = 30^\circ$  ו- $l = 3 \text{ cm}$ . בטא את גודל המטען  $q$  באמצעות  $\alpha$ ,  $m$ ,  $l$ ,  $d$  וחשב את גודל המטען  $q$ .

## תשובות סופיות:

$$(1) \quad F = -2.56 \cdot 10^9 \text{ N}, \text{ כוח המשיכה.}$$

$$(2) \quad \text{א. שניהם נעים בכיוונים הפוכים, ב- } F = 21.6 \text{ N. ג. } a_1 = -7.2 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \hat{x}, a_2 = 2.7 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2} \hat{x}$$

$$(3) \quad \text{א. } |F_1| = |F_2| = 7.94 \cdot 10^{-2} \text{ N}, \theta_1 = 30.96^\circ, \theta_2 = 210.96^\circ. \text{ ב. } a_1 \approx 2.65 \cdot 10^{-2} \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$$

$$(4) \quad \sum \vec{F}_1 = 15.75 \text{ N} \hat{x}, \sum \vec{F}_2 = 27 \text{ N} \hat{x}, \sum \vec{F}_1 = 42.75 \text{ N} \hat{x}$$

$$(5) \quad \sum F_y = \frac{kq^2}{a^2} \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$(6) \quad q = \sqrt{\frac{mg}{k} \tan(15^\circ) L^2 (2 - \sqrt{3})}$$

$$(7) \quad \omega = \sqrt{17} \cdot 10^{16} \frac{1}{\text{sec}}$$

$$(8) \quad \sum F = 3.897 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

$$(9) \quad \text{א. } q_1 : \text{שלילי}, q_2 : \text{חיובי. ב. } q_2 = 7.11 \mu\text{C. ג. } \sum F_x = 37.5 \text{ N}$$

$$(10) \quad q \approx 5.2 \cdot 10^{-8} \text{ C}, q = \sqrt{\frac{mg \tan \alpha}{k}} (d + 2l \sin \alpha)$$